



HOMILADORLIKNING ERTA BOSQICHIDA BACHADONDAN
TASHQARI HOMILANI ANIQLASHDA UTTNING ROLI

To`raqulova Sevinch Sattorjon qizi

samasevax@gmail.com

+998992364506

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Dolzarbligi. Bachadondan tashqari homiladorlik barcha homiladorliklarning taxminan 1–2% ini tashkil etadi va ginekologik shoshilinch holatlar ichida eng xavflilaridan biri hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, reproduktiv yoshdagi ayollarda onalar o'limining 6–10% bachadondan tashqari homiladorlik asoratlari bilan bog'liq. Kech aniqlangan holatlarda bachadon nayining yorilishi 60–70% bemorlarda uchraydi va og'ir ichki qon ketish, gemorragik shok hamda bepushtlikka olib kelishi mumkin. Zamonaviy radiologik diagnostika usullaridan biri bo'lgan ultratovush tekshiruvi yordamida bachadondan tashqari homiladorlikni erta aniqlash imkoniyati 85–95% gacha yetadi. Shu sababli ushbu muammoni radiologiya va ginekologiya kesishgan nuqtada o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Maqsad. Homiladorlikning erta bosqichida bachadondan tashqari homilani aniqlashda ultratovush tekshiruvining diagnostik ahamiyatini baholash.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda ginekologiya bo'limiga bachadondan tashqari homiladorlik gumoni bilan murojaat qilgan 30 nafar ayol tekshirildi. Bemorlarning yoshi 18–40 yosh oralig'ida bo'ldi. Barcha bemorlarda ultratovush tekshiruvi ikki bosqichda o'tkazildi: dastlab transabdominal usul to'q qorin holatida, keyinchalik esa transvaginal usul siydik pufagi bo'sh holatda amalga oshirildi. Diagnostik aniqlikni oshirish uchun tekshiruvlar 48 soat



oralig'ida takroran o'tkazildi va natijalar klinik belgilar hamda β -XG darajasi bilan solishtirildi.

Natija. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ultratovush tekshiruvi yordamida bachadondan tashqari homiladorlik **26 bemorda (86,7%)** erta bosqichda aniqlangan. Shundan **22 holatda (73,3%)** homila bachadon nayida joylashgani, **4 holatda (13,4%)** esa boshqa atipik lokalizatsiya kuzatildi. Transvaginal ultratovush usulining diagnostik aniqligi **94%**, transabdominal usulniki esa **68%** ni tashkil etdi. Bachadon nayining yorilishi bilan kechgan kech tashxis holatlari **13,3%** bemorda qayd etildi.

Xulosa. Ultratovush tekshiruvi bachadondan tashqari homiladorlikni erta aniqlashda eng muhim, xavfsiz va samarali diagnostik usul hisoblanadi. Ayniqsa, transvaginal ultratovush usuli yuqori aniqlik ko'rsatkichiga ega bo'lib, asoratlarning oldini olish imkonini beradi. Bachadondan tashqari homiladorlikni o'z vaqtida aniqlash ayol hayotini saqlash va reproduktiv funksiyani himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.