

YALLIG'LANISHGA QARSHI DORILAR. SHISH VA OG'RIQNI YENGILLASHTIRADIGAN DORILAR

Urganch Abu Ali Ibn Sino nomidagi
jamoat salomatligi texnikumi katta
o'qituvchisi Abduraxmanov Maxsud
Karimovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada yallig'lanishga qarshi dorilar. Shish va og'riqni yengillashtiradigan dorilar atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shish, yallig'lanish, steroid

To'g'ri davolanish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish uchun qo'shma yallig'lanish alomatlari bo'lsa, shifokoringizga murojaat qilish muhimdir. Yallig'lanishni davolash uchun maxsus dorilar qo'llaniladi:

- * Steroid bo'lmagan (NSAID). Qo'shimchalar uchun yallig'lanishga qarshi dorilarning eng keng tarqalgan turi. Ular yallig'lanish va og'riqni kamaytirishga yordam beradi, shuningdek isitmani pasaytiradi. Nsaidlarga aspirin, ibuprofen va naproksen kiradi.
- * Kortikosteroidlar. Shishishni kamaytirishga va og'riqni yo'qotishga yordam beradigan gormonal dorilar. Kortikosteroidlar bo'g'imga kiritiladi yoki tabletka sifatida qabul qilinadi.
- * Siklooksigenaza-2 blokerlari. Cox - 2 yallig'lanishga qarshi dorilarning yangi sinfidir. Ular yallig'lanish jarayonida ishtirok etadigan fermentlarni blokirovka qilish orqali ishlaydi. Ushbu turga selekoksib va rofekoksib kiradi.
- * Beta-laktam antibiotiklari. Stafilokokklar ta'siridan kelib chiqadigan qo'shma muammolarga yaxshi yordam bering. Ushbu turdagi eng samarali dorilardan biri Sefazolindir.
- * Yallig'lanishga qarshi malham va jellar. Yumshoq shakldagi dorilar mahalliy foydalanish uchun ishlatiladi. Ular yallig'lanish va og'riqni kamaytiradi va

bo'g'implarning harakatchanligini yaxshilaydi. Ushbu turdagi mashhur dorilar diklofenak va ketoprofendir.

Shuni ta'kidlash kerakki, yallig'lanishga qarshi qo'shma dorilar oshqozon-ichak trakti muammolari, qon bosimining ko'tarilishi va yurak-qon tomir kasalliklari xavfi kabi nojo'ya ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. Ulardan qochish uchun mutaxassis bilan maslahatlashing.

Preparatni tanlashdan oldin yallig'lanish sababini aniqlash kerak. Bu artrit, revmatizm yoki boshqa kasalliklar bo'lishi mumkin. Agar siz bo'g'implarning yallig'lanishiga shubha qilsangiz, shifokoringizga murojaat qiling. U kerakli tekshiruvlarni o'tkazadi va tegishli davolanishni buyuradi.

Shifokor yallig'lanish sababini aniqlaganida, u tegishli preparatni tanlaydi. Mahsulotni tanlashda uning samaradorligi, xavfsizligi va yon ta'siri hisobga olinadi. Preparatni shifokor bergan ko'rsatmalarga muvofiq qabul qiling. Dozani oshirmang yoki dozani o'tkazib yubormang.

Davolashni boshlaganingizdan so'ng, sog'lig'ingizni kuzatishingiz kerak. Agar biron bir nojo'ya ta'sir yoki yomonlashuvni sezsangiz, shifokoringizga murojaat qiling.

Zamonaviy yallig'lanishga qarshi qo'shma dorilar artrit, artroz va mushak – skelet tizimining boshqa kasalliklaridan aziyat chekadigan odamlar uchun haqiqiy topilma. Ular yallig'lanishni engillashtiradi, og'riqni kamaytiradi va bo'g'implarning harakatchanligini yaxshilaydi va shuning uchun ushbu kasallikdan aziyat chekayotganlarning hayot sifatini yaxshilaydi. Ammo, har qanday dori-darmonlarni qabul qilish, agar siz davolanishga har tomonlama yondashsangiz, yordam berishi mumkin.

Bir qator og'riq qoldiruvchi dorilar ham Yallig'lanishga qarshi dorilardir. Sifatida ishlatiladi. Bular yallig'lanishga qarshi ta'siri jihatidan glyukokortikoidlardan kuchsizroq, qo'shimcha kasalliklarni ham nisbatan kam keltirib chiqaradi. Shu tufayli og'riq qoldiruvchi dorilar bo'g'imlar, muskullar va ichki a'zolar yallig'lanishida keng qo'llanadi. Ular analgetik va isitma tushiruvchi ta'sirga ega. Ko'pgina dorivor o'simliklar (mas, bo'yimodaron, mavrak va boshqalar) ba'zi teri va shilliq qavatlar

kasalliklarida yallig'lanishga qarshi yaxshi naf beradi. Me'daichak yo'llari yallig'langanda (ayniqsa bolalarda) shilimshiq holidagi dori buyuriladi. U bevosita yallig'lanishga qarshi ta'sir etmay, faqat shilliq pardani o'rab oladi va uni har xil ta'sirlardan saqlaydi.

Burishtiruvchi dorilar ham yallig'lanishga qarshi kuchsizroq ta'sir etadi, ular asosan teri va shilliq pardalar yallig'langanda ishlatiladi. Burishtiruvchi dorilar to'qimaning oqsil moddalari bilan birga himoya qatlami hosil qilib, shilliq pardalarni va shikastlangan sirlarni turli ta'sirotlardan saqlaydi va yallig'lanish jarayonining avj olishiga yo'l qo'ymaydi.

Aseptik yallig'lanishda (ayniqsa, allergik yoki autoallergik to'qimalar shikastlanganda) yallig'lanishga qarshi steroid vositalarning immunodepressiv ta'siri alohida ahamiyatga ega.

Immunodepressantlar, asosan, immunitet hujayra omiliga susaytiruvchi ta'sir ko'rsatib, sitostatik ta'sir hisobiga yallig'lanishning proliferativ bosqichini bartaraf etadi. YA.q.d. kelib chiqish sabablari turlicha bo'lgan yallig'lanish kasalliklarini davolashda qo'llanadi. Ulardan ko'pincha revmatizmga qarshi vosita sifatida foydalaniladi. Yallig'lanishga qarshi steroid vositalar miokarditlar, o'tkir va surunkali nefritlar, gepatitlar va boshqalar ichki a'zolarining yallig'lanish kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.S.S.Azizova. Farmakologiya. Darslik. Toshkent. Yangi asr avlodi.2006
2. Фармакология. Тиббиёт институтлари талабалари учун дарслик. - Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2000. - 496 бет.
3. Фармакология · Муallif: Д.Харкевич · Resurs turi: Xorijiy adabiyotlar · Adabiyot turi: Darslik · Yili: 2017