

QANDLI DIABET KASALLIGI

Tojiyeva Dilnoza Tulqin qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Boshqaruv va menejment fakulteti

Fundamental tibbiyot yunalishi

2-bosqich talabasi.

Adizova Maftuna Sadriddin qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Boshqaruv va menejment fakulteti

Fundamental tibbiyot yunalishi

2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada qandli diabet kasalligida glyukoza almashinuvining gistologik asoslari va uning buzilish mexanizmlari keng yoritilgan. Insulin va glyukagon gormonlarining normal sharoitdagi vazifalari hamda qandli diabetda ularning o‘zaro muvozanati buzilishi tahlil qilingan. Glyukoza hujayralarga kirishining kamayishi natijasida energiya almashinuvidagi o‘zgarishlar, yog‘ va oqsil metabolizmining buzilishi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, qandli diabetda mikrosirkulyatsiya buzilishlari va ularning turli a‘zo va tizimlarga ko‘rsatadigan salbiy ta’siri yoritilgan. Maqola qandli diabetning patologik mexanizmlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: qandli diabet, glyukoza almashinuvi, insulin, glyukagon, metabolizm, insulin yetishmovchiligi.

Kirish: Qandli diabet zamonaviy tibbiyotda eng keng tarqalgan va dolzarb metabolik kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik organizmda uglevod almashinuvining

buzilishi bilan tavsiflanib, qonda glyukoza miqdorining doimiy oshib borishi bilan kechadi. Qandli diabetning asosiy patogenetik omili insulin gormonining yetishmovchiligi yoki uning biologik ta'siriga to'qimalarning sezgirligi pasayishi bilan bog'liqdir. Natijada glyukoza hujayralarga yetarli darajada kira olmaydi va organizmning energetik muvozanati izdan chiqadi. Glyukoza organizm uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Uning almashinuv jarayonlari murakkab gormonal va fermentativ mexanizmlar orqali boshqariladi. Insulin gormoni glyukozaning hujayralarga kirishini ta'minlab, glikogen sintezini kuchaytiradi va qonda glyukoza miqdorini me'yorida ushlab turadi. Glyukagon esa qarama-qarshi ta'sir ko'rsatib, glikogen parchalanishini va glyukozaning qonga chiqishini rag'batlantiradi. Qandli diabetda ushbu gormonlar o'rtasidagi fiziologik muvozanat buzilib, glyukoza almashinuvida jiddiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Qandli diabet nafaqat uglevod almashinuvini, balki yog' va oqsil almashinuvini ham izdan chiqaradi. Insulin yetishmovchiligi sharoitida hujayralar energiya tanqisligini boshdan kechiradi, natijada yog'larning parchalanishi kuchayadi va keton tanachalari hosil bo'lishi ortadi. Bu holat metabolik asidoz rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Oqsil almashinuvining buzilishi esa mushak massasining kamayishi va umumiy metabolik disbalans bilan namoyon bo'ladi. Qandli diabetning uzoq davom etishi ko'plab a'zo va tizimlarda, ayniqsa yurak-qon tomir, asab tizimi, buyrak va ko'zlarda funksional va morfologik o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ushbu asoratlarning rivojlanishida glyukoza almashinuvining buzilishi bilan bir qatorda mikrosirkulyatsiya tizimidagi o'zgarishlar ham muhim rol o'ynaydi. Kapillyar devorlarining shikastlanishi va qon oqimining buzilishi to'qimalarda kislorod va oziq moddalari yetishmovchiligiga olib keladi. Shu sababli qandli diabetda glyukoza almashinuvining fiziologik buzilishlarini chuqur o'rganish kasallik patogenezini to'liq tushunish, uning asoratlarini oldini olish va samarali davolash usullarini ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada qandli diabet sharoitida glyukoza almashinuvining buzilish mexanizmlari fiziologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Asosiy qism: Qandli diabet, qand kasalligi — organizmda insulin tanqisligi va moddalar almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Qand

kasalligi sharq xalq tabobat tarixida juda qadimdan ma'lum. Abu Ali ibn Sino bu dardga alohida e'tibor bergan. "Suv qanday ichilgan bo'lsa, shu holda chiqadi", deb yozadi u bemorning ko'p suv ichishi boshqa kasalliklarni ham keltirib chiqaradi va bemor juda ozib ketadi. Davolarga to'xtab tabib: "Bemorga sovuq mizojli suyuqliklar ichir, sovuqjomga sol, nordon ayron ichir, mevalar ber, yalpiz damlab ichir, ya'ni bemorni ho'lla, sovut", deydi. Bu — kasallik odam organizmida issiqlikning oshib ketishi tufayli paydo bo'lishini bildiradi. Qand kasalligi tarixiy tibbiy manbalarga ko'ra, nasliy bo'lishi ham mumkin. Qandli diabetda qonda qand moddasi keskin ko'payib, siydik bilan chiqib turadi (tarkibida qand moddasi bo'ladi), tashnalik, og'iz qurishi, ozib ketish, quvvatsizlik, badan qichishishi va boshqalar alomatlar kuzatiladi. Kasallikning irsiy yoki hayotda orttirilgan, shuningdek, insulinga bog'liq (diabetning 1 turi) va insulinga bog'liq bo'lmagan (diabetning 2 turi) turi farq qilinadi. Diabetning 1 turi ko'pincha o'smirlik yoshida uchraydi. Bunda bemor organizmida me'da osti bezi hujayralari insulin ishlab chiqara olmaydi va ularni davolashda qand miqdorini pasaytirish maqsadida insulin preparatlari qo'llanadi. Qandli diabetning 2 turida me'da osti bezi orolcha hujayralaridan insulin ishlab chiqarish saqlanib qoladi, bunda qon tarkibidagi insulin miqdori me'yorida yoki undan sal yuqoriroq bo'ladi. Biroq, to'qimalarning insulinga nisbatan sezgirligi keskin pasayishi tufayli to'qimalar tomonidan glyukozani o'zlashtirish hamda foydalanish kamayadi va u qon tarkibida to'planib qoladi, natijada qonda qand miqdori ko'payib, siydik bilan chiqib turadi, bemor juda semirib ketadi. Diabetning bu turi bilan, asosan, o'rta va keksa yoshdagilar kasallanadilar. Kasallik asta-sekin, zimdan rivojlanadi, u boshlanishida og'iz qurishi, chanqash, ozish kabi alomatlar yaqqol bilinmaydi. Bemorni ko'proq holsizlanish, toliqish, tashnalik bezovta qiladi. Qon tarkibidagi glyukoza miqdori yuqori bo'lishiga qaramay, diabetning 2 turida qon tarkibida atseton modsasining ortishi va uning siydikda paydo bo'lishi juda kam kuzatiladi. Bunday bemorlar insulin qabul qilmay yashashlari mumkin. Ularga parhez, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, qand miqdorini kamaytiruvchi dorilar qabul qilish yaxshi naf beradi. Qandli diabet — bir umrlik kasallik, uni butun hayot davomida davolash zarur. To'lato'kis davolanmaydigan va qon tarkibidagi glyukoza miqdori uzoq vaqt yuqori saqlanadigan bemorlarda Qandli diabetning tomir asoratlari —

diabetga xos angiopatiyalar (makro va mikroangiopatiyalar) namoyon bo‘ladi. Bu barcha a‘zolarining (teri, muskullar, nerv va hokazo) kapillyarlarini shikastlaydi. Diabetga xos mikroangiopatiyalar buyrak, ko‘z, oyoq va boshqalar a‘zolarida ko‘proq va ertaroq kuzatiladi. Qandli diabet ateroslerozning rivojlanishi, o‘z navbatida, yurakning ishemik kasalligi (stenokardiya, miokard infarkti), miyada qon aylanishining buzilishi (bosh aylanishi, miya insulti) va hokazoga olib keladi. Qandli diabetning har ikkala turida ham davolashdan asosiy maqsad iloji boricha qondagi qand miqdorini kamaytirish, sog‘lom kishilardagi ko‘rsatkichga yaqinlashtirish, ya‘ni kompensatsiya holatiga erishishdir. Qondagi qand miqdorini me‘yorida saqlab turishning asosiy yo‘li qondagi glyukozani iloji boricha teztez aniklash; bunday nazorat Qandli diabetning insulinga bog‘liq 1 turida juda zarur. Uy sharoitida mustaqil holda qondagi glyukoza miqdorini aniqlashda maxsus reaktiv qog‘ozlardan foydalanish mumkin. Buning uchun ukol igna yordamida barmoqdan bir tomchi qon reaktiv qog‘ozga olinadi (qon qog‘ozni bir chetidagi chiziqchalarga tushiriladi). Bir daqiqadan so‘ng qog‘ozdagi qon paxta bilan artib tashlanadi va yana bir daqiqa o‘tgach, reaktiv qog‘oz rangi shkala bilan solishtiriladi. Rangi eng yaqin bo‘lgan shkala ko‘rsatkichi shu qondagi glyukoza miqdorini mmol/l (mg%) da ifodalaydi. Xuddi shunday usulda uy sharoitida siydikdagi qand miqdorini ham bemorlarning o‘zlari mustaqil maxsus reaktiv qog‘ozlar yordamida aniqlashlari mumkin. Agarda qonda yoki siydikda glyukoza miqdori baland bo‘lsa, darhol tegishli davo muolajalarini amalga oshirish lozim. Bulardan tashqari, bemorlar tana vaznlarini ham haftada bir marotaba nazorat qilishlari hamda uni o‘z bo‘yi, yoshi va kasbiga mos bo‘lgan me‘yorda saqlab turishlari kerak. Qandli diabetda davo har bir bemorning umumiy ahvoli, kasallik alomatlari, qon, siydik tahlili va boshqalarga qarab tayinlanadi, u bosqichmabosqich olib boriladi. Davolanish muddati kasallikning og‘irengilligi, o‘tkazib yuborilgan yoki yangiligi va turiga bog‘liq.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, qandli diabet organizmda glyukoza almashinuvining chuqur va murakkab buzilishlari bilan kechadigan surunkali metabolik kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallikning asosida insulin gormonining yetishmovchiligi yoki uning biologik ta‘siriga to‘qimalarning sezgirliги pasayishi yotadi. Natijada glyukoza

hujayralarga yetarli miqdorda kira olmaydi va qonda uning miqdori ortib boradi, bu esa organizmning energetik muvozanatini izdan chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gistolo giyU sitologiya" embriologiya: darslik / prof. Q.R. To'xtayev tahriri ostida. Toshkent : HILOL MEDtrA. 2A22. - 528 bet
2. Gistologiy4 sitologiya va embriologiya : darslik / Q.R. To'xtayev, F.X. Azlz,ova, E.A. Tursunov, M.A. Abduraxmanov, Q.f. Rasulov, M.X. Raxmatova. to'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. - Toshkent : IJOD-PRINT,2023. - 720 bet
3. fucrolorrfi, su6pnoJromf,, rlreronorrur : yre6urrr / IO.H. Ai[anacbeB, B.B. Arerunr, H.fl. Eapcyron [u Ap.]; roA pea. IO.H. A\$anacbeBa, H.A. Iopuuofr. -7- e LBAaHr4e, uepepadmaHHoe H AorronHeHHoe. - Mocxsa : f3OTAP-Mewrq 2021. - 832 crp
4. Gistologiya : darslik / F.S. Oripov, X.X. Boykuziyev. - Samarqand: "Fan bulog'i" nashriyoti,z023. - 216 bet 5. Gistologiya: darsLk /Zufarov K.n -T.,2005